

# انجام مرحله تکمیلی عملیات ایمن سازی فلج اطفال از ۲۵ تا ۲۷ بهمن

13 بهمن 1404

**معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام عملیات تکمیلی ایمن سازی فلج اطفال در کشور در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ خبر داد.**

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در اطلاعیه این معاونت آمده است: عملیات ایمن سازی تکمیلی به عنوان یکی از مهمترین استراتژی‌های ریشه کنی فلج اطفال است که از سال ۱۳۷۳ تاکنون در کشور اجرا می‌شود. انجام این عملیات در حفظ دستاورد عاری بودن کشور از بیماری فلج اطفال از سال ۱۳۷۹ تاکنون نقش مهمی داشته و امسال نیز بر اساس برنامه ریزی انجام شده مرحله اول این عملیات در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ دی به صورت فعال و خانه به خانه برای کلیه کودکان زیر ۵ سال ایرانی و غیر ایرانی ساکن در مناطق پرخطر محدوده تحت پوشش ۲۲ دانشگاه واقع در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، بوشهر، یزد، جنوب کرمان، فارس و خوزستان و با استفاده از قطره خوراکی فلج اطفال انجام شد.

مرحله دوم برای تاریخ ۲۵ تا ۲۷ بهمن برنامه ریزی شده است. انتظار می‌رود در این عملیات حدود هفتصد هزار کودک قطره خوراکی فلج اطفال را دریافت کرده باشند.

**بنا بر اعلام معاونت بهداشت مناطق پرخطر عملیاتی به شرح ذیل هستند:**

ساکنین حاشیه شهرها با دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی، کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه‌ها و یا خارج از اردوگاه‌ها اقامت دارند، کلیه خانوارهای ساکن در کلنی‌ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی، شهرستان‌های دارای مرز مستقیم خاکی و دریایی با افغانستان و پاکستان، کلیه نقاط (شهرستان - شهرک، کلنی و...) که بر اساس داده‌های سامانه‌های الکترونیکی سطح اول، پوشش OPV۳ و IPV۲ کمتر از ۹۵ درصد دارند، کلیه کودکان زیر ۵ سالی که احتمالاً همراه با مادران خود در زندان‌ها اقامت دارند.

همچنین سایر استان‌های کشور در بهار سال ۱۴۰۵ واکسیناسیون فلج اطفال را برای کودکان ساکن در مناطق پرخطر انجام خواهند داد.

گفتنی است برنامه جهانی ریشه کنی فلج اطفال و حفظ دستاوردهای آن از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر است. هرچند که تلاش‌ها برای تحقق اهداف برنامه در دو کشور بومی فلج اطفال همسایه (افغانستان و پاکستان) همچنان تداوم دارد، ولی با توجه به تشدید مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی و همچنین تداوم گردش ویروس در این دو کشور و شناسایی ۳۰ مورد ابتلا انسانی به فلج اطفال در پاکستان و ۹ مورد در افغانستان و همچنین شناسایی ویروس در نمونه‌های متعدد فاضلاب دو

کشور مذکور در سال ۲۰۲۵، خطر ورود ویروس فلج اطفال به ایران بیش از پیش افزایش یافته است.