

زنان بیشتر از مردان دچار میگرن می شوند

6 دی 1400

محققان می گویند سطح هورمون در رحم ممکن است عاملی باشد که باعث می شود زنان بیشتر از مردان به میگرن مبتلا شوند.

به گزارش "[مادران دختران](#)" به نقل از هلت لاین، میگرن ۲ تا ۳ برابر بیشتر از مردان، زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. گزینه های درمان میگرن در چند سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است.

نتایج یک مطالعه بر روی دوقلوها در مقیاس بزرگ، ارتباط بین خطر میگرن و میزان هورمون موجود در رحم قبل از تولد را نشان می دهد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا، از بزرگترین پایگاه داده دوقلوها برای بررسی نقش محیط قبل از تولد بر روی تفاوت های جنسی در خطر میگرن استفاده کردند.

این مطالعه همچنین نشان می دهد ژن هایی که بر خطر میگرن تأثیر می گذارند ممکن است در مردان و زنان متفاوت باشد.

شیوع میگرن در زنان ۲ تا ۳ برابر بیشتر از مردان است. این مشکل نسبتاً شایع است و حدود ۱۲ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

میگرن یک بیماری عصبی است که باعث مجموعه ای از علائم، از جمله حالت تهوع، سرگیجه، و افزایش حساسیت به نور، صداها و بوها می شود.