

سقط جنین غیرمجاز چه آسیبی به مادر وارد می‌کند؟

31 شهریور 1404

یک متخصص زنان، زایمان و نازایی گفت: گاهی در سقطهای غیرمجاز برای باز شدن دهانه رحم از وسایلی استفاده می‌کنند که می‌تواند پارگی رحم یا دهانه رحم را موجب شود؛ همچنین اگر تجهیزات مورد استفاده استریل نباشد می‌تواند باعث عفونت‌های شدید شود.

زهرا سادات فاطمی گفت: ختم خود به خودی یا عمدی حاملگی قبل از اینکه جنین به سن حیات رسیده باشد را سقط می‌گویند؛ در سقط معمولاً کمتر از ۲۰ هفته را مدنظر قرار می‌دهند چون جنین کمتر از ۵۰۰ گرم و حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم است.

وی ادامه داد: زمانی فرد می‌تواند سقط قانونی انجام دهد که جنین کمتر از ۱۹ هفته داشته و روح در بدن جنین وجود نداشته باشد.

این متخصص زنان، زایمان و نازایی تصریح کرد: اگر تخم پوچ باشد فقط کیسه آب رشد می‌کند در این صورت مادر می‌تواند به صورت قانونی اقدام به سقط کند. در مواردی نیز قلب تشکیل نمی‌شود که این سقط بعد از هفته هشتم صورت می‌گیرد، برای این سقط باید دو سونوگرافی با فاصله دو هفته انجام و پزشک مطمئن شود که قلب و یا جنین تشکیل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که بارداری برای مادر خطرات زیادی داشته باشد و حیات مادر را تهدید کند از طریق پزشکی قانونی می‌توان برای سقط اقدام کرد، اگر در مواردی مانند اختلالات کروموزومی ثابت شود که جنین تشکیل شده با حیات مغایر است می‌توان مجوز سقط را صادر کرد.

این متخصص زنان، زایمان و نازایی گفت: اگر سقط قانونی و تحت نظر متخصص انجام شود و پزشک در کاری که انجام می‌دهد مهارت داشته باشد و از اصول علمی استفاده و سقط را تحت شرایط استریل انجام دهد معمولاً عارضه خاصی دیده نمی‌شود.

وی افزود: در مواردی که سقط غیرمجاز، بدون امکانات مناسب و به صورت مخفیانه انجام شود آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت، اگر سقط به دست افرادی غیرماهر انجام شود به دلیل عدم استریل می‌تواند آسیب زیادی ایجاد کند.

فاطمی خاطرنشان کرد: باکتری‌های محیط رحم می‌تواند بیمار را به سمت شوک سپتیک و حتی به مرگ بکشاند بنابراین خیلی مهم است که این کار به صورت مجاز و از طریق افرادی متخصص انجام شود در غیر این صورت عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

این متخصص زنان، زایمان و نازایی تصریح کرد: در موارد غیرمجاز، سقط ناکامل می‌تواند موجب

عفونت شود و به علت باقی ماندن جفت، خونریزی‌های شدید را در پی داشته باشد، همچنین می‌تواند موجب پولیپ‌های رحمی شود.

وی بیان کرد: زوجینی که تمایل به بارداری ندارند باید روش مطمئنی برای جلوگیری داشته باشند تا بارداری ناخواسته ایجاد نشود که ناگزیر برای سقط‌های غیرمجاز اقدام کنند.

فاطمی تصریح کرد: کسانی که قصد بارداری دارند قبل از اقدام به بارداری خانم‌ها و در صورت امکان آقایان آزمایشات لازم را انجام دهند تا در صورت وجود بیماری خاصی نظیر افزایش قند خون و تیروئید و بیماری‌های خاص ژنتیک اقوام درجه یک بررسی لازم صورت گیرد و پس از اصلاح مشکلات تصمیم به بارداری گرفته شود.

این متخصص زنان، زایمان و نازایی یادآور شد: در مورد افرادی که سقط‌های مکرر دارند بررسی‌های بیشتری نیاز است و آزمایش‌هایی برای این امر وجود دارد تا با آزمایشات ژنتیک، عکس رنگی و آزمایشات متعدد بررسی لازم انجام شود و در صورت وجود مشکل اقدام درمانی صورت گیرد.

خبرنگار : سیده زهرا حسینی فلاح