

علت اسهال نوزاد بعد از واکسن چیست؟

2 اردیبهشت 1402

واکسن روتاویروس می تواند از بیماری روتاویروس پیشگیری کند. روتاویروس بیشتر در نوزادان و کودکان خردسال سبب اسهال می شود. اسهال می تواند شدید باشد و باعث کم آبی بدن شود. استفراغ و تب هم در نوزادان مبتلا به روتاویروس متداول است.

واکسن روتاویروس

واکسن روتاویروس با ریختن قطره در دهان کودک تزریق می گردد. نوزادان باید 2 یا 3 دوز واکسن روتاویروس، بسته به مارک واکسن مورد استفاده، تزریق کنند.

نخستین دوز باید پیش از 15 هفتگی تجویز شود. آخرین دوز باید تا 8 ماهگی تجویز گردد. تقریباً همه نوزادانی که واکسن روتاویروس می زنند از اسهال شدید روتاویروس ایمن می شوند.

اسهال پس از واکسن تا کی ادامه دارد؟

اسهال شدن نوزاد پس از واکسن حداکثر 2 تا 3 روز بعد رفع می شود. در صورت آشکار شدن نشانه های کم آبی یا طولانی شدن اسهال باید به فکر دیگر علل اسهال نوزاد بود. بعد هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنید.

مراحل کم آبی بدن کودک به علت اسهال

مرحله خفیف

نشانه های اسهال نوزاد پس از واکسن در این دسته جای می گیرند. نوزاد قدری تشنه و ناآرام است. حال عمومی خوبی دارد. لبها و مخاط خشک نیستند. نوزادان نیز خوب شیر می خورند و بی حال نیستند.

مرحله متوسط

کم شدن اشک، کاهش خفیف ادرار، فرورفتگی خفیف ملاج نوزاد رخ می دهد، نوزاد بی قرار است و لبها قدری خشک هستند.

مرحله شدید

نوزاد بی حال و خواب آلود است. لبها و مخاطها به طور کامل خشک می شوند. چنانچه پوست قفسه سینه کودک را میان دو انگشت (مثل نیشگون) بگیرید، پوست در همان وضعیت باقی می ماند و با تاخیر

بیش از 3 ثانیه به صورت اول بر می‌گردد. در این مرحله نوزاد قادر به خوردن مایعات نیست و باید به سرعت تحت درمان با سرم قرار بگیرد. در غیر این صورت خطر مرگ نوزاد را تهدید می‌کند.