

افزایش آمار مبتلایان به HIV در ایران

28 آبان 1403

در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در ایران مبتلا به HIV هستند.

بنابراین مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در بین بیمارانی که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ شناسایی شده‌اند، در ۶۵.۲ درصد از موارد، روابط جنسی به‌عنوان راه احتمالی انتقال بیماری شناسایی شده است. پیام طبرسی متخصص بیماری‌های عفونی نیز با تایید این آمار به شهروند می‌گوید: «از ابتدای شناسایی بیماری تا کنون ۴۰ هزار نفر در ایران مبتلا به HIV شده‌اند که از این تعداد ۲۴ هزار نفر زنده‌اند و حدود ۱۵ هزار نفر فوت کرده‌اند.»

تغییر درصد انتقال ویروس HIV در زنان و مردان

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت عنوان می‌کند: «به‌طور کلی، حدود ۸۱ درصد از کل موارد تشخیص داده‌شده را مردان و ۱۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. اما الگوی انتقال ویروس و درصد ابتلای زنان و مردان در سال‌های اخیر تغییر کرده است. به‌طوری که در پایان ۶ ماه اول سال جاری، ۳۲ درصد از موارد ثبت‌شده را زنان و ۶۸ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.»

روابط جنسی در صدر علت ابتلا به HIV

او ادامه می‌دهد: «در بین بیمارانی که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ تشخیص داده شده‌اند، تنها در ۱۰ درصد از موارد ابتلا، علت آن اعتیاد تزریقی بوده و ۶۵.۲ درصد از موارد ابتلا به دلیل روابط جنسی بوده است. همچنین ۰.۷ درصد انتقال از مادر به کودک بوده و در ۲۴.۱ درصد از موارد، راه احتمالی ابتلا بیان نشده است. همچنین، هیچ مورد ابتلای جدیدی از طریق خون و فرآورده‌های خونی ثبت نشده است.»

راه‌های انتقال ویروس HIV

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تصریح می‌کند: «HIV یک بیماری عفونی است که اغلب مردم آن را با نام ایدز می‌شناسند، در حالی که ایدز مرحله انتهایی بیماری HIV است که اگر فرد به‌موقع و به‌طور صحیح تحت مراقبت و درمان قرار گیرد، ممکن است تا آخر عمر به ایدز مبتلا نشود.» مرادی می‌گوید: «ویروس HIV که عامل ابتلا به بیماری ایدز است، از طریق کار کردن با یکدیگر، زندگی دسته‌جمعی، هم‌صحبت شدن و معاشرت‌های اجتماعی یا تماس روزمره با افراد آلوده مانند هم‌سفر بودن، هم‌کلاس بودن، نشستن در کنار یکدیگر و از راه هوا منتقل نمی‌شود.»

حدود ۳ درصد کمتر از ۲۰ سال سن دارند



مرادی می‌گوید: «در بین افراد شناسایی شده تا پایان ۶ ماه اول ۱۴۰۳، حدود ۳ درصد از کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص، کمتر از ۲۰ سال سن داشتند. همچنین ۷۳ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۴۵ سال قرار دارند و ۲۴ درصد بالای ۴۵ سال هستند. الگوی سنی در سال‌های اخیر تغییر چندانی نکرده است.»

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره علل عمده ابتلا به ویروس HIV بیان می‌کند: «علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال ۱۳۶۵ تاکنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب عبارتند از: تزریق با وسایل مشترک در مصرف‌کنندگان موادمخدر، رابطه جنسی و انتقال از مادر به کودک. در ۱۶,۶ درصد از این موارد، راه انتقال نامشخص باقی مانده است.»

طی یک دهه اخیر روند ابتلا به این ویروس صعودی بوده است

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی به «شهروند» می‌گوید: «یکی از راه‌های پیشگیری، آموزش روابط جنسی سالم و مطمئن است.» محرز ادامه می‌دهد: «انتقال از طریق مصرف موادمخدر تزریقی هم بالاست هرچند در سال‌های اخیر گرایش معتادان بیشتر به سمت مصرف روانگردان‌ها و مواد صنعتی رفته، بنابراین روابط جنسی در صدر عامل انتقال این ویروس قرار دارد.» این متخصص بیماری‌های عفونی اظهار می‌کند: «آمار ابتلا به این ویروس در کشورمان بالاست. متأسفانه طی یک دهه اخیر روند ابتلا به این ویروس صعودی بوده و در مقابل سن ابتلا هم کاهش یافته است.»

درمان HIV رایگان است

به گفته محرز درمان قطعی ویروس HIV به دلیل کووید به تعویق افتاده است. او می‌گوید: «قبل از

کووید در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تحقیقاتی در خصوص درمان این ویروس شکل گرفت اما هنوز به نتیجه نرسیده است. البته این امید وجود دارد درمان قطعی این بیماری زودتر یافت شود.» این متخصص بیماری‌های عفونی بیان می‌کند: «داروهای ویروس HIV بسیار گران است، بنابراین رایگان در اختیار مبتلایان گذاشته می‌شود.»

محرز عنوان می‌کند: «درمان ویروس HIV از سال ۱۹۹۶ شروع شد. این پروسه درمانی کمک می‌کند تا این بیماران عمر طبیعی داشته باشند. هرچند برخی از افرادی که آزمایش می‌دهند برای درمان معالجه نمی‌کنند که این فاجعه است.» او بیان می‌کند: «اسامی مبتلایان به این بیماری کاملاً محرمانه در وزارت بهداشت ثبت می‌شود.»

*سلامت نیوز