

سرطان روده؛ بیماری خاموشی که با تشخیص زودهنگام قابل کنترل است

30 فروردین 1404

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به نقش پیشگیری در سرطان روده، گفت: انجام غربالگری منظم پس از ۵۰ سالگی می‌تواند از بروز بیماری جلوگیری کند، همچنین داشتن سبک زندگی سالم، مصرف میوه و سبزی، غلات کامل، ورزش، پرهیز از دخانیات و الکل و حفظ وزن مناسب، از دیگر راه‌های مؤثر پیشگیری است.

دکتر زهرا کشت پور املشی با بیان اینکه سرطان روده بزرگ چهارمین سرطان شایع در بین بانوان ایرانی است، اظهار کرد: این سرطان در میان آقایان نیز سومین سرطان شایع محسوب می‌شود.

وی افزود: سرطان روده بزرگ معمولاً قسمت پایینی دستگاه گوارش، یعنی روده بزرگ و راست روده را درگیر می‌کند و با افزایش سن، احتمال ابتلا به این بیماری نیز بیشتر می‌شود و پس از ۵۰ سالگی خطر ابتلا چندین برابر می‌شود.

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به منشأ این بیماری، عنوان کرد: سرطان روده بزرگ معمولاً از پولیپ‌های روده یا رشد غیرطبیعی سلول‌ها در پوشش داخلی روده به وجود می‌آید، اگرچه همه پولیپ‌ها سرطانی نمی‌شوند، اما بسیاری از آنها می‌توانند به سرطان تبدیل شوند.

دکتر کشت پور درباره علائم هشداردهنده این بیماری بیان کرد: تغییر در عادت اجابت مزاج، ضعف و خستگی دائمی، درد و ناراحتی شکمی، وجود خون در مدفوع، کاهش وزن شدید و خونریزی از مقعد از نشانه‌هایی است که باید جدی گرفته شود و فرد در صورت مشاهده این علائم باید به متخصص گوارش مراجعه کند.

وی در ادامه با اشاره به عوامل خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، گفت: سن بالای ۵۰ سال، سابقه فردی یا خانوادگی ابتلا به این بیماری، بیماری‌های التهابی مزمن روده، سندرم‌های ارثی، رژیم غذایی پرچرب به ویژه مصرف فست‌فودهایی مانند سوسیس و کالباس، بی‌حرکی، استعمال دخانیات، مصرف الکل و سابقه پرتو درمانی شکمی، همگی می‌توانند ریسک ابتلا را افزایش دهند.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی افزود: به طور کلی، نرخ بقای پنج‌ساله بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ حدود ۶۵ درصد است، اما این میزان بستگی مستقیم به مرحله‌ای دارد که بیماری در آن تشخیص داده می‌شود، هرچه تشخیص زودتر صورت گیرد، حتی پیش از بروز علائم از طریق غربالگری، احتمال بهبودی کامل افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اهمیت مرحله تشخیص، خاطرنشان کرد: روند درمان و بهبودی به میزان درگیری غدد لنفاوی و زمان مراجعه بیمار بستگی دارد، درمان اصلی این بیماری جراحی است که در آن بسته به میزان پیشرفت سرطان، بخشی یا کل روده برداشته می‌شود، پس از جراحی، شیمی‌درمانی یا درمان‌های هدفمند انجام می‌شود و در برخی موارد نیز پرتو درمانی توصیه می‌شود.

پس از ۵۰ سالگی، همه افراد باید هر ۱۰ سال یک‌بار کولونوسکوپی انجام دهند

وی با اشاره به نقش پیشگیری در این بیماری افزود: انجام غربالگری منظم پس از ۵۰ سالگی می‌تواند از بروز بیماری جلوگیری کند، همچنین داشتن سبک زندگی سالم، مصرف میوه و سبزی، غلات کامل، ورزش، پرهیز از دخانیات و الکل و حفظ وزن مناسب از دیگر راه‌های مؤثر پیشگیری است.

The advertisement is on a green background. At the top, a black box contains the text 'مشاوره تلفنی' (Teleconsultation) in white. Below this, a white box with a black border contains the following information: 'مرکز تخصصی' (Specialized Center) in a purple box, logos for 'سازمان بهداشت جهانی' (World Health Organization) and 'سازمان بهداشت ایران' (Iranian Health Organization), and the text 'مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده' (Marriage and Family Strengthening Consultation). The main title 'حال خوب' (Good Situation) is written in large white letters. To the right is a circular logo with a stylized human figure. At the bottom of the white box, it says 'شماره: ۵۹۱۰' (Number: 5910) and 'سال تأسیس: ۱۴۰۲' (Year of Establishment: 1402). Below the white box, a blue box contains 'دکتر رویا درویش پیشه' (Dr. Roya Drouish Pish). A large orange box displays the phone number '۰۹۱۰۲۹۰۴۷۵۸'. At the bottom, a white box contains 'ازدواج و زوج درمانی' (Marriage and Couple Therapy).

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به نقش برخی داروها در پیشگیری، اظهار کرد: در برخی موارد با تشخیص پزشک، مصرف آسپرین نیز می‌تواند به پیشگیری از سرطان روده کمک کند. با این حال، مؤثرترین راهکار پیشگیری، غربالگری منظم به‌ویژه کولونوسکوپی است، حتی در زمانی که فرد هیچ علامتی ندارد، با انجام این آزمایش می‌توان بیماری را در مراحل اولیه شناسایی و درمان کرد.

دکتر کشت پور تاکید کرد: پس از ۵۰ سالگی، همه افراد باید هر ۱۰ سال یک‌بار کولونوسکوپی انجام

دهند و همچنین تست‌های مدفوعی که توسط پزشک تجویز می‌شود نیز باید هر سه سال یکبار تکرار شوند.

وی در خصوص درمان در مراحل پیشرفته، گفت: در صورتی که بیماری در مراحل پیشرفته تشخیص داده شود، درمان از ابتدا می‌تواند شامل شیمی‌درمانی و درمان‌های هدفمند باشد.

تأثیر استرس بر سرطان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین درباره تأثیر استرس بر سرطان گفت: استرس به طور مستقیم می‌تواند منجر به سبک زندگی ناسالم شود و همین عامل در ابتلا به انواع سرطان‌ها نقش دارد.

بر اساس گزارش ویدا، دکتر کشت پور املشی در پایان با ردّ این تصور اشتباه که انجام تست غربالگری موجب ایجاد بیماری می‌شود، تصریح کرد: بیماری پیش از انجام تست وجود داشته و بدون علامت بوده است، انجام غربالگری باعث تشخیص زودهنگام و جلوگیری از پیشرفت بیماری می‌شود و شانس بهبودی کامل را افزایش می‌دهد.