

شرط تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا اعلام

شد

28 فروردین 1401

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: افراد بالای ۱۸ سال دارای سابقه ضعف سیستم ایمنی می‌توانند یکی از واکسن‌های نوترکیب را به فاصله حداقل ۴ ماه پس از مرحله سوم به عنوان نوبت چهارم دریافت کنند.

“علی گل محمدی” افزود: ملاک تشخیص ضعف سیستم ایمنی، ارائه گواهی از پزشک متخصص است و اظهارنظر شخصی و شفاهی افراد مورد قبول نیست.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تعریف ضعف سیستم ایمنی بر اساس سند کشوری گسترش واکسیناسیون کرونا، شامل نقایص اولیه سیستم ایمنی، بیماری‌های خاص مانند سرطان تحت درمان با شیمی‌درمانی و پرتودرمانی، بیماران پیوند عضو شده، بیماران دریافت کننده داروهای سرکوب کننده یا تضعیف کننده سیستم ایمنی، افراد اچ آی وی مثبت و بیماران تحت درمان با دیالیز هستند.

“علی گل محمدی” درباره امکان تزریق دوز چهارم و پنجم [واکسن کووید ۱۹](#) برای متقاضیان سفر بین‌المللی، تصریح کرد: افرادی که که سه نوبت از واکسن‌های موجود در کشور را دریافت کرده اند و به علت الزامات سفر باید یک یا دو نوبت واکسن دیگر را تزریق کنند، با اخذ رضایت کتبی و آگاهانه و ارائه مدارک سفر می‌توانند دوز چهارم و پنجم را از واکسن‌های مورد تأیید کشور مقصد دریافت کنند.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها خاطرنشان کرد: در این شرایط فاصله دوز سوم و چهارم حداقل یک ماه و فاصله توصیه شده بین دوز چهارم و پنجم سه ماه است که در صورت اضطرار سفر، می‌تواند به حداقل یک ماه کاهش یابد.

به گفته وی، تزریق نوبت چهارم [واکسن کرونا](#) در مراکز جمعی واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه ایران در حال انجام است.