

هیچ ارتباطی بین واکسن کووید و خطر سقط جنین وجود ندارد

18 خرداد 1404

یک مطالعه جدید می‌گوید هیچ ارتباطی بین واکسن کووید ۱۹ و سقط جنین وجود ندارد.

به گزارش هلث دی نیوز، محققان گفتند که کووید خطرات قابل توجهی برای زنان باردار، از جمله زایمان زودرس، مرگ مادر و نیاز به مراقبت‌های ویژه برای مادر یا نوزاد پس از زایمان، ایجاد می‌کند.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که میزان واکسیناسیون در بین زنان باردار همچنان پایین است، که بخشی از آن به دلیل اطلاعات نادرست در مورد ایمنی واکسن است.

در این مطالعه جدید، محققان هیچ ارتباطی بین سقط جنین و واکسیناسیون کووید ۱۹، هنگام مقایسه زنانی که زایمان زنده موفق داشتند با زنانی که سقط جنین کردند، پیدا نکردند.

دکتر «سانگینی شت»، محقق اصلی و دانشیار علوم زنان، زایمان و تولید مثل در دانشکده پزشکی ییل کنیتکت، گفت: «ما امیدواریم که داده‌هایی مانند داده‌های ما، اطمینان بیشتری در مورد ایمن بودن واکسن ایجاد کند و شاهد افزایش این میزان‌ها باشیم.»

مانند اکثر آزمایش‌های بالینی، زنان باردار در ابتدا از آزمایش‌های واکسن کووید کنار گذاشته شدند.

با وجود این، محققان گفتند که این واکسن به دلیل خطرات بیشتر عوارض بارداری در صورت ابتلا به کووید، برای زنان باردار توصیه می‌شود.

شت گفت: «توصیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها این بود که واکسن را از زنان باردار دریغ نکنند، زیرا می‌تواند مزایای نجات‌بخشی برای مادر و جنین داشته باشد.»

محققان گفتند تعدادی از مطالعات انجام شده از زمان تأیید واکسن، بی‌خطر بودن آن را برای زنان باردار تأیید کرده‌اند. به عنوان مثال، این واکسن‌ها هیچ ارتباطی با مرده‌زایی ندارند و زنان واکسینه شده احتمال بیشتری دارد که بارداری‌های سالم‌تری داشته باشند.

برای این مطالعه، محققان داده‌های پرونده الکترونیکی سلامت را تجزیه و تحلیل کردند تا مشخص کنند که آیا واکسن با خطر بیشتر سقط جنین مرتبط است یا خیر.

طبق گزارش، این تیم ۲۹۶ بیمار که دچار سقط جنین شده بودند را با ۵۹۲ بیمار که زایمان سالمی داشتند مقایسه کردند و هیچ ارتباطی بین سقط جنین و تعداد واکسن‌هایی که یک زن دریافت کرده بود، پیدا نکردند.

شث گفت: «این مطالعه همچنان نشان می‌دهد واکسن‌های کووید ۱۹ در دوران بارداری بی‌خطر هستند. زنانی که در اوایل بارداری هستند یا کسانی که به بارداری فکر می‌کنند، با توجه به خطرات بیماری کووید ۱۹، باید تشویق شوند که اگر هنوز واکسینه نشده‌اند، اقدام کنند.»