

افراد مبتلا به اوتیسم درد را شدیدتر احساس می‌کنند

20 بهمن 1401

تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که مبتلا به اوتیسم هستند، درد را با شدت بیشتری نسبت به دیگران احساس می‌کنند. دکتر «تامی بار-شالیتا»، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «ما می‌دانیم که خودآزاری می‌تواند ناشی از تلاش برای سرکوب درد باشد و ممکن است آنها به‌خود صدمه بزنند.» این مطالعه شامل 52 بزرگسال مبتلا به [اوتیسم](#) بود.

در این مطالعه یک محقق با استفاده از کامپیوتر، مدت و شدت محرک را کنترل می‌کند. از فرد معاینه شده خواسته شد تا شدت درد را در مقیاس 0 تا 100 رتبه‌بندی کند. این مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به اوتیسم بیشتر آسیب می‌بینند.

بار-شالیتا افزود: «اوتیسمی‌ها» به درد بی‌تفاوت هستند». نتایج نشان می‌دهد حساسیت به درد افراد مبتلا به اوتیسم در واقع بیشتر از اکثر افراد جامعه است، در حالی‌که آنها در سرکوب مؤثر محرک‌های دردناک ناموفق هستند.