افزایش نرخ سرطان در زنان با گرمای شدید

17 خرداد 1404

طبق یک مطالعه جدید، همزمان با افزایش دما در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دو دهه گذشته، مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان نیز افزایش یافته است.

به گزارش مادران ودختران به نقل از خبرگزاری مهر(به نقل از واشنگتن پست) ، یافته‌های اولیه به تحقیقات بیشتر در مورد اثرات دما و تغییرات اقلیمی بر سلامت کمک می‌کند.

دانشمندان سرطان‌های سینه، تخمدان، رحم و دهانه رحم را در میان زنان در ۱۷ کشور بررسی کردند و چیزی را کشف کردند که آن را افزایش کوچک اما قابل توجه در موارد و مرگ و میر نامیدند.

نویسندگان نوشتند که این ارتباط در حالی رخ می‌دهد که تغییرات اقلیمی از طریق افزایش اشعه ماورا بنفش و آلاینده‌های هوا، قرار گرفتن در معرض خطر سرطان را افزایش می‌دهد.

محققان گفتند که تخریب لایه ازن می‌تواند به معنای قرار گرفتن بیشتر در معرض اشعه ماورا بنفش باشد. دمای بالاتر همچنین می‌تواند منجر به خشکسالی و آتش‌سوزی‌های جنگلی شود که می‌توانند باعث آلودگی شوند.

«ایرینا استپانوف»، استاد بهداشت عمومی و عضو مرکز سرطان ماسونی دانشگاه مینه سوتا، گفت: «این شرایط می‌تواند قرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از عوامل مرتبط با خطر سرطان را افزایش دهد.»