

# شرط تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا اعلام شد

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: افراد بالای ۱۸ سال دارای سابقه ضعف سیستم ایمنی می‌توانند یکی از واکسن‌های نوترکیب را به فاصله حداقل ۴ ماه پس از مرحله سوم به عنوان نوبت چهارم دریافت کنند.

"علی گل محمدی" افزود: ملاک تشخیص ضعف سیستم ایمنی، ارائه گواهی از پزشک متخصص است و اظهار نظر شخصی و شفاهی افراد مورد قبول نیست.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تعریف ضعف سیستم ایمنی بر اساس سند کشوری گسترش واکسیناسیون کرونا، شامل نقایص اولیه سیستم ایمنی، بیماری‌های خاص مانند سرطان تحت درمان با شیمیدرمانی و پرتو درمانی، بیماران پیوند عضو شده، بیماران دریافت کننده داروهای سرکوب کننده یا تضعیف کننده سیستم ایمنی، افراد اج آی وی مثبت و بیماران تحت درمان با دیالیز هستند.

"علی گل محمدی" درباره امکان تزریق دوز چهارم و پنجم واکسن کووید ۱۹ برای متقاضیان سفر بین‌المللی، تصريح کرد: افرادی که که سه نوبت از واکسن‌های موجود در کشور را دریافت کرده‌اند و به علت الزامات سفر باید یک یا دو نوبت واکسن دیگر را تزریق کنند، با اخذ رضایت کتبی و آگاهانه و ارائه مدارک سفر می‌توانند دوز چهارم و پنجم را از واکسن‌های مورد تأیید کشور مقصد دریافت کنند.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها خاطرنشان کرد: در این شرایط فاصله دوز سوم و چهارم حداقل یک ماه و فاصله توصیه شده بین دوز چهارم و پنجم سه ماه است که در صورت اضطرار سفر، می‌تواند به حداقل یک ماه کاهش یابد.

به گفته وی، تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا در مراکز تجمعی واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه ایران در حال انجام است.