

علت تنبلی چشم در کودکان؛ این نشانه ها را جدی بگیرید

3 خرداد 1405

تعداد نداشتن ماهیچه های چشم، تفاوت در وضوح بینایی دو چشم و گاهی مشکلاتی مانند آب مروارید می توانند ناحیه کدوری در عدسی چشم ایجاد کنند. اما چطور علائم تنبلی چشم را تشخیص دهیم؟

همه ما با ضعف در بینایی به دنیا آمدیم و با گذشت زمان، سیستم بینایی مان به مرحله ای می رسد که همه چیز را خوب ببینیم. اتفاقی که برای بعضی ها نمی افتد و باعث تنبلی چشم در کودکی می شود.

این یکی از بیشترین مشکلاتی است که برای کودکان زیر ۷ سال پیش می آید و دلیل هم این است که یکی از چشم های کودک هنوز با مغز ارتباط کاملی ندارد.

در واقع مغز تصویر ارسال شده از چشم ضعیف تر را نادیده می گیرد و این باعث ضعیف تر شدن چشم می شود.

تعداد نداشتن ماهیچه های چشم، تفاوت در وضوح بینایی دو چشم و گاهی مشکلاتی مانند آب مروارید می توانند ناحیه کدوری در عدسی چشم ایجاد کنند. اما چطور علائم تنبلی چشم را تشخیص دهیم؟ تشخیص سریع، در درمان تنبلی چشم بسیار موثر است. به همین دلیل لازم است که علائم اولیه این بیماری را بشناسید.

به رفتار و شرایط فرزندتان دقت کنید و اگر علائم زیر را در او مشاهده کردید، از یک متخصص اطفال یا متخصص چشم پزشکی نوبت بگیرید:

انحراف یکی از چشم ها به سمت بالا، پایین، چپ یا راست

چشم دوختن، بستن یک چشم یا کج کردن سر برای دیدن محیط

مشکل در دیدن یا درک عمق تصاویر و محیط اطراف یا افتادگی پلک بالایی

اگر این علائم را در فرزندتان مشاهده کردید، هرچه سریع تر اقدام کنید، روند درمان راحت تر خواهد بود.