

# چرا بخیه سزارین عفونت می‌کند؟

12 دی 1402

عمل جراحی سزارین یک روش برای زایمان است که ممکن است با عفونت همراه شود. در این مقاله، ما قصد داریم علت‌ها، علائم و درمان عفونت بخیه سزارین را بررسی کنیم تا به خوانندگان کمک کنیم تا اطلاعات لازم را در این زمینه به دست آورند. این مقاله شامل عوامل خطر، نشانه‌ها و روش‌های درمان عفونت زخم پس از [سزارین](#) می‌شود.

## عوامل خطر عفونت بخیه سزارین

بر اساس داده‌های ارائه شده، عوامل خطر بسیار متنوع هستند و ممکن است شامل عواملی مانند سن بالای ۳۰ سال، شاخص توده بدنی بالا، مدت زمان عمل سزارین بیش از ۱.۵ ساعت، از دست دادن خون بیش از ۴۰۰ میلی لیتر و مدت زمان استفاده از کاتتر ادراری بیش از ۲۴ ساعت است. این عوامل مستقل خطر برای عفونت بخیه سزارین شناخته شده‌اند.

## بیماری‌های مزمن و عفونت‌های قبلی

بیماری‌های مزمن مانند [دیابت](#)، افزایش قند خون، فشار خون بالا و عفونت‌های قبلی می‌توانند احتمال ابتلا به عفونت بخیه سزارین را افزایش دهند. این بویژه برای بیماران با سابقه عفونت‌های مجاری ادراری یا عفونت‌های جراحی قبلی مهم است.

## ضرورت استفاده از آنتی بیوتیک

بر اساس این مطالعه، استفاده از آنتی بیوتیک درمانی ضروری است، از جمله برای مقابله با باکتری‌های *Escherichia coli* و *Enterococcus faecalis* که حساسیت بالایی به سفتازون، مروپنم و لوفلوکساسین دارند. این اقدام می‌تواند به کنترل بهتر عفونت‌ها کمک کند.

## عوارض جراحی سابق

بر اساس این مطالعه، عوارض جراحی سابق می‌تواند به عنوان یکی از عوامل خطرناک برای عفونت بخیه سزارین شناخته شود. بنابراین، تدابیر پیشگیری و مداخلات بالینی برای این جمعیت لازم است تا از وقوع عفونت بخیه بعد از سزارین جلوگیری شود.

## نشانه‌های عفونت زخم پس از سزارین

## تورم، قرمزی و درد در محل جراحی

عفونت زخم پس از عمل سزارین ممکن است با تورم، قرمزی و درد در محل جراحی همراه باشد. این علائم معمولاً در چند روز پس از عمل جراحی ظاهر می‌شوند. قرمزی دور زخم، تورم نامعمول دور زخم و درد شدید در محل زخم نشانه‌های احتمالی از عفونت زخم پس از سزارین می‌باشند.

## تب و لرز

یکی دیگر از نشانه‌های عفونت زخم پس از سزارین، تب و لرز است. تب بالای ۳۸ درجه سانتی‌گراد و لرزش بدن نشانه‌هایی از عفونت داخلی یا رحم پس از سزارین می‌باشند و نیاز به توجه و درمان فوری دارند.

## ترشحات نامطلوب از جراحی

در صورتی که ترشحات نامطلوبی از محل جراحی مشاهده شود، این ممکن است یکی از علائم عفونت زخم پس از سزارین باشد. نشت مایع از زخم، ترشحات نامطلوب و بوی نامطلوب از محل جراحی نشانه‌های احتمالی از عفونت زخم می‌باشند.

## ضعف و خستگی شدید

اگر بعد از عمل سزارین احساس ضعف و خستگی شدید کنید، این ممکن است نشانه‌ای از عفونت زخم پس از سزارین باشد. ضعف و خستگی شدید ممکن است به دلیل عفونت واکنش بدن به آن باشد و نیاز به اقدامات درمانی فوری دارد.