

# بیماری شایع رحم در زنان

## 1- تومورهای بدخیم

### علائم بالینی :

- خونریزی و ترشح غیر عادی به خصوص بعد از [بائسگی](#) یا خونریزی زیاد هنگام عادت ماهانه
- اشکال یا درد در هنگام ادرار کردن
- مقاربت دردناک
- درد در ناحیه لگن

## 2-رحم واژگون

### علائم بالینی:

رحم واژگون معمولاً نشانه ای ندارد. بندرت ممکن است دردهایی در کمر و احساس سنگینی در بخش تحتانی لگن خاصره حس شود. و اغلب نیازی به درمان نیست.

## 3- آندومتریوت

اندومتریوت عفونت مخاط رحم است و علائم بالینی آن خونریزیهای نامرتب، ترشحات مهملی، درد و حساسیت در زیر شکم، احساس ضعف، تب، اختلال در ادرار است

## 4- پولیپ مخاط رحم

نشانه های پولیپ مخاط رحم درد از نوع گرفتگی عضلانی هنگام عادت ماهانه، خونریزی مختصر در فاصله قاعدگیها، خونریزی فراوان هنگام قاعدگی و ترشحات مهملی است

## 5-سرطان رحم

یکی از سرطانهای شایع مجرای تناسلی زن [سرطان رحم](#) است، اما با این حال میزان شیوع آن پنج بار کمتر از سرطان دهانه رحم است. و خیلی دیرتر از سرطان دهانه رحم و اغلب در زنانی که بیش از 50 سال دارند.

## علائم بالینی:

- افزایش حجم رحم
- خونریزی نامرتب مهبل زنانی که قاعدگیشان مرتب است.
- خونریزی پس از یائسگی.

## 6- چسبندگی رحم

### علائم بالینی:

ناباروری، نامنظمی سیکل ماهیانه مانند کاهش خونریزیها یا قطع ناگهانی سیکل‌های قاعدگی، درد دوره‌ای در ناحیه لگن و سقطهای مکرر جنین اشاره کرد. 43 درصد از زنان مبتلا به چسبندگی‌های رحمی از ناباروری رنج می‌برند.

## 7- افتادگی رحم

بارداری، افزایش فشار به پایین شکم، یبوست مزمن، چاقی مفرط حتی سرفه‌های مزمن و طولانی یا وجود نداشتن هورمون استروژن مخصوصا در دوران یائسگی باعث بروز این بیماری می‌شود

### علائم بالینی:

درد و فشار زیر شکم، بی‌اختیاری ادرار، احساس فوریت در ادرار، تکرر ادرار، در موارد شدید با احتباس ادراری و درد ناشی از آن و آنوری (عدم تشکیل ادرار)، یبوست، اسهال، بی‌اختیاری مدفوع، کمر درد، پهلو درد، درد لگن، ناراحتی کلی لگن، دیس پارونی (درد موقع نزدیکی)، افزایش حجم خونریزی قاعدگی، خونریزی زیاد قاعدگی+لکه بینی

## 8- چسبندگی لوله‌های رحمی

کسانی که از IUD استفاده می‌کنند احتمال التهاب‌های لگنی و لوله‌های رحمی بیشتر است. چسبندگی‌ها بیشتر دردهای مبهم شکمی خواهد داشت و اگر بیماری دچار اندومتریوز باشد، دردها کاملا مشخص خواهد بود.

### علائم بالینی:

چسبندگی لوله‌های رحمی علامت خاصی ندارد و بیماران اغلب به صورت ثانویه به پزشک مراجعه می‌کنند؛ ثانویه با دردهای شدید یا ثانویه با نازایی و... که در این مواقع، پزشک باید شرح حالی از بیمار بگیرد و مشکل را تشخیص دهد. اما در بیمارانی که خونریزی قاعدگی کم

یا قطع شود یا قاعدگی دردناک، نازایی و سقط مکرر شایع تر است

## 9- پولیپ های رحم

### علائم بالینی:

- ترشحات ابکی و خون الود از مهبل(واژن)
- خونریزی بعد از مقاربت جنسی
- خونریزی در فواصل بین عادات ماهانه
- خونریزی بعد از یائسگی
- خونریزی از مهبل در ایامی غیر از دوران قاعدگی

## 10- فیبروم رحم:

### علائم بالینی:

خونریزی شدید و غیرعادی قاعدگی از شایع ترین علامت وجود فیبروئید رحمی است. اگر فیبروم ها در نزدیکی لایه های داخلی رحم باشند و یا در خونرسانی به لایه های داخلی رحم اختلال ایجاد کنند، می توانند باعث قاعدگی سنگین و دردناک شوند. در این شرایط معمولا قاعدگی طولانی مدت و لکه بینی بین دوره های قاعدگی وجود خواهد داشت. خانم های دچار قاعدگی سخت و طولانی مدت، معمولا به کم خونی فقر آهن مبتلا می شوند.

همچنین فیبروئید ها بسته به اندازه و محل شان در رحم می توانند منجر به علائم زیر شوند:

- درد و فشار در ناحیه لگن
- تکرر ادرار
- عدم توانایی در تخلیه کامل مثانه
- عفونت مجاری ادراری که معمولا از عدم تخلیه کامل مثانه ناشی می شود.
- یبوست
- درد پاها و کمر