

تزریق واکسن پنوموکوک در سه نوبت الزامی است

13 مرداد 1403

مسئول اداره ایمن سازی وزارت بهداشت گفت: در برنامه کشوری واکسیناسیون کودکان؛ از این پس تزریق واکسن پنوموکوک در سه نوبت ۲ ماهگی، ۴ ماهگی و ۱۲ ماهگی الزامی است.

دکتر زهرایی گفت: این واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و دارو است و ۱۰ سویه شایع باکتری پنوموکوک را پوشش می‌دهد.

وی اظهار کرد: پنوموکوک یکی از مهمترین علل عفونی است که موجب عفونت‌های شدید در همه گروه‌های سنی می‌شود، اما در گروه‌های سنی زیر ۲ سال عفونت‌های شدیدتر، بستری شدن و حتی مرگ را در پی خواهد داشت.

زهرایی گفت: با تزریق این واکسن می‌توان از مرگ سالانه بیش از ۱۱۰۰ کودک زیر ۵ سال جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: همچنین با کاهش سالانه هزاران بستری در سطح کشور میزان مصرف دارو و آنتی بیوتیک‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: تزریق این واکسن موجب تب و بیقراری کودک می‌شود که با خوراندن چند قطره استامینوفن قابل کنترل است.