

واکسن HPV □ پیشگیری موثر از سرطان دهانه

رحم

20 آذر 1404

عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، گفت: واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات پیشگیرانه، نقش اساسی در کاهش بروز سرطان‌های زنان، به‌ویژه سرطان دهانه رحم دارد.

بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا، مطالعات جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که واکسیناسیون را به طور گسترده اجرا کرده‌اند، شاهد کاهش چشمگیر موارد سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی بوده‌اند.

دکتر سیمین ظفردوست – متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری گفت: این واکسن در سه نوع مختلف ارائه می‌شود؛ دوز ظرفیتی علیه تیپ‌های ۱۶ و ۱۸، چهار ظرفیتی علیه تیپ‌های ۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸، و ۹ ظرفیتی که ۹ تیپ شایع ویروس HPV از جمله انواع پرخطر و کم‌خطر را پوشش می‌دهد.

به گفته وی، بهترین زمان تزریق واکسن HPV در سنین ۹ تا ۱۴ سال و پیش از شروع فعالیت جنسی است. با این حال، تزریق آن برای افراد تا ۲۶ سال و در برخی شرایط خاص تا ۴۵ سال نیز توصیه می‌شود.

این متخصص زنان در پایان اشاره کرد: ایمنی بالای واکسن HPV در مطالعات متعدد تأیید شده است. عوارض جانبی آن معمولاً خفیف بوده و شامل درد یا قرمزی در محل تزریق و گاهی تب خفیف است.

کارشناسان تأکید می‌کنند واکسیناسیون HPV ابزاری حیاتی برای دختران و پسران در پیشگیری از سرطان‌های مرتبط با این ویروس است و لازم است در سن مناسب مورد توجه خانواده‌ها و نظام سلامت قرار گیرد.